

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nobivac Puppy DP vakcina A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Hollandia

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Nobivac Puppy DP vakcina A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

A vakcina adagonként (1 ml) a következőket tartalmazza:

Hatóanyagok:

Élő, attenuált szopornyica vírus (Onderstepoort törzs)	10 ^{5,0-6,0} TCID ₅₀ *
Élő, attenuált kutya parvovírus (CPV 154-es törzs)	10 ^{7,0-8,4} TCID ₅₀

A vírusokat szövettenyészetben szaporították. A vakcina nyomokban antibiotikumot is tartalmazhat.

*TCID₅₀ sejtenyészetben fertőző adag 50%-a

4. JAVALLAT(OK)

Egészséges kutyák szopornyica (CDV) és parvovírus okozta bélgyulladás (CPV) elleni aktív immunizálására.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretesek.

6. MELLÉKHATÁSOK

Mint minden vakcina alkalmazásakor, esetenként túlérzékenységi reakció előfordulhat.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

1 adag/állat

Subcutan alkalmazással.

A liofilizált vakcinát közvetlenül a felhasználás előtt 1 ml Nobivac Diluent A.U.V. oldószerben, vagy 1 adag Nobivac Rabies, Nobivac Lepto, Nobivac L4, Nobivac RL vakcinában kell feloldani.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Szopornyica és parvovírus ellen magas szintű maternális védelemmel rendelkező, egészséges kölyökkutyák oltására ajánlott. Kb. 6 hetes életkorban az anyai eredetű ellenanyagok mennyisége már annyira lecsökken, hogy az nem befolyásolja kedvezőtlenül a vakcinázás eredményességét. A magas szintű maternális védelemmel rendelkező kölyökkutyák esetében, a fertőző májgyulladás (CAV1), a CAV2 és a parainfluenza vírus fertőzések elleni védelem biztosítása érdekében a Nobivac DHP, vagy DHPPI vakcinával 8 hetes korban először, majd 3 hét múlva megismételt oltás ajánlott.

Ajánlott vakcinázási program

Mivel valószínű, hogy a Nobivac Puppy DP vakcinával történő immunizálás egy átfogó vakcinázási program részét fogja képezni, a liofilizátum oldása lehetséges 1 adag Nobivac Lepto, a Nobivac L4, a Nobivac Rabies, Nobivac RL vakcinákban. Vakcinázási tervként a következőket javasoljuk:

1. Alapimmunizálás

4-6 hetes életkorban	Nobivac Puppy DP
6-8 hetes életkorban	Nobivac DHP vagy DHPPi és Nobivac Lepto/ Nobivac L4
10 hetes életkorban	Nobivac DHP vagy DHPPi és Nobivac Lepto/ Nobivac L4
12 hetes kortól	Nobivac Rabies

2. Emlékeztető oltások

Nobivac DHP, Nobivac DHPPi és Parvo-C vakcinákkal háromévente, a Puppy DP vakcinával kétévente egyszer végzett emlékeztető oltás ajánlott. A veszettség elleni évenkénti újraoltás jogszabály szerint kötelező és jogszabály írja elő a vakcinázáshoz felhasználható vakcinák összetételét is.

Vemhesség ideje alatt alkalmazható.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Fénytől védve, +2 - +8°C hőmérsékleten tárolandó. Nem fagyasztható.

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejárati ideje: 24 hónap.

Feloldott vakcina: 30 percen belül felhasználandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Csak egészséges állatokat vakcinázzunk.

Ha az immunizálás egy átfogó vakcinázási program része, a liofilizátum oldása lehetséges a Nobivac Lepto, a Nobivac L4, a Nobivac Rabies, a Nobivac RL vakcinákban.

Az ártalmatlanságra és hatékonyságra vonatkozó adatok alapján bizonyított, hogy ez a vakcina keverve szubkután alkalmazható a Nobivac vakcina család inaktivált veszettség elleni (Nobivac Rabies és Nobivac RL) és leptospirozis elleni (*Leptospira interrogans* Canicola szerocsoport Canicola szerovariáns, *L. interrogans* Icterohaemorrhagiae szerocsoport Copenhageni szerovariáns, *L. interrogans* Australis szerocsoport Bratislava szerovariáns valamint *L. kirschneri* Grippytyphosa szerocsoport Bananal/Lianguang szerovariáns tartalmú) vakcinájával (Nobivac Lepto és Nobivac L4). Ha a vakcinát önmagában kívánjuk alkalmazni, akkor a vakcinát a saját hígítójával (Nobivac Diluent) kell feloldani.

Az ártalmatlanságra és hatékonyságra vonatkozó adatok alapján bizonyított, hogy ez a vakcina egyidejűleg, de nem keverve alkalmazható Nobivac vakcinacsalád inaktivált *Bordetella bronchiseptica*-t tartalmazó vakcinájával.

Nem áll rendelkezésre információ a vakcina más állatgyógyászati készítménnyel történő egyidejű alkalmazásának hatékonyságára és ártalmatlanságra vonatkozóan, kivéve a fent említett készítményeket. A vakcina használata előtt vagy után más állatgyógyászati készítmény alkalmazását az eset egyedi megítélésétől függően szükséges eldönteni.

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA
2021. december 7.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

15.1. Rendelhetőség

Vényköteles.

Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

15.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

15.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

10x1 adag, üvegben és karton vagy műanyag dobozban.

15.4. Törzskönyvi szám

3096/1/12 MgSzH ÁTI (1 adag)

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Intervet Hungária Kft.