

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Animedazon spray, 2,45 w/w %os külsőleges szuszpenziós spray szarvasmarhák, juhok és sertések kezelésére A.U.V.

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

aniMedica GmbH  
Im Südfeld 9  
48308 Senden-Bösensell  
Németország

Forgalmazza:  
Medicus Partner Kft.  
2051 Biatorbágy  
Tel.: 23/530-540

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Animedazon spray, 2,45 w/w %os külsőleges szuszpenziós spray szarvasmarhák, juhok és sertések kezelésére A.U.V.  
Klórtetraciklin-hidroklorid

### 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 palack tartalmaz:

#### Hatóanyag:

Klórtetraciklin-hidroklorid 3,210 g (megfelel 2,45 w/w %-nak)  
(amely 2,983 g klórtetraciklinnek felel meg)

#### Segédanyag(ok):

Patent Blue V 85 % (E 131): 0,23 g  
Izobután (hajtógáz) 92,2 g

Egyenletes kék színű spray

### 4. JAVALLAT(OK)

Traumás vagy műtéti eredetű felületi sebek kezelésére, amelyek klórtetraciklinre érzékeny kórokozókkal fertőződtek. A készítmény alkalmazható a felületes bőr és csülök fertőzés terápiájának részeként, különösen klórtetraciklinre érzékeny mikroorganizmusok okozta interdigitális dermatitisz (bűdös sántaság és interdigitális nekrobacillózis) és a lábvégek gyulladással megbetegedésének terápiájában.

### 5. ELLENJAVALLATOK

Tetraciklinekkel szemben fennálló túlérzékenység esetén nem alkalmazható. Tetraciklinekkel szembeni ismert rezisztencia esetén nem alkalmazható.

### 6. MELLÉKHATÁSOK

Túlérzékenységi reakció ritkán előfordulhat.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, juh és sertés.

## 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Külsőleges alkalmazásra. Használat előtt a palackot alaposan fel kell rázni! A palackot a kezelendő felülettől kb. 15-20 cm távolságra kell tartani, és a sprayt 3 másodpercig kell alkalmazni, amíg a kezelendő felület egyenletesen be nem színeződik. Ha a fertőzés a lábvégeket érinti, a kezelést 30 másodperc után meg kell ismételni. A klórtetraciklinre érzékeny kórokozók által fertőzött felületi sebekre egyszeri kezelés javasolt. A digitális dermatitisz kezelése során három egymást követő napon tanácsos napi egyszeri vagy kétszeri kezelést végrehajtani úgy, hogy egy kezelés során a szert 30 másodperces szünettel kétszer alkalmazzák. Büdös sántaság és interdigitális nekrobacillózis kezelésekor a szert ajánlatos 30 másodperces szünettel megismételve, naponta egyszer vagy kétszer alkalmazni, a tünetek súlyosságától és a gyógyulás ütemétől függően 1-3 napon keresztül.

## 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Lásd a 8. „Adagolás, alkalmazási mód(ok) célállat fajonként.” szakaszt.

## 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, juh és sertés hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap

Tej: nulla nap

Nem alkalmazható laktáló állatok tögyén, ha emberi fogyasztásra szánt tejet termelnek.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Csak a palackon/dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A palack túlnyomás alatt áll, melegítés során felrobbanhat.

Közvetlen napfénytől védve tartandó. 50°C-nál melegebb helyre nem kerülhet.

Hőtől/forró felületektől/szikrától/nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Tilos a közelében dohányozni.

Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

A palackot még kiürülése után is tilos kilyukasztani vagy tűzbe dobni!

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

### A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

Az állat szemét védeni kell, ha a spray-t a fej körül alkalmazzák. A spray használata előtt az érintett területet alaposan le kell tisztítani. A készítményt az antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok eredményei alapján az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó irányelvek figyelembevételével kell alkalmazni. Meg kell akadályozni, hogy az állat a saját vagy másik állat kezelt testfelületeit nyalogassa. A lábvégek kezelése után az állatokat legalább egy órán át száraz talajon kell elhelyezni.

### Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A szenzibilizálódás, kontakt dermatitisz valamint túlérzékenységi reakció kialakulásának a veszélye miatt kerülni kell a bőrrel való érintkezést. A szer alkalmazása során vízhatlan védőkesztyűt kell viselni. A készítmény súlyos szemirritációt okozhat. A szemeket és az arcot óvni kell. A bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetén azonnal le kell mosni az érintett területet friss tiszta vízzel. Nem múló irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Nem szabad belélegezni a szer gőzeit! A kezelést csak a szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben szabad végezni. Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. A készítmény alkalmazása közben dohányozni és enni tilos. Használat után kezét kell mosni.

Lásd még az 11 pontot „Különleges tárolási előírások”.

### Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás

Az Animedazon spray külsőleges alkalmazását követően a klórtetraciklin felszívódása elhanyagolható mértékű, ezért vemhesség és laktáció idején történő alkalmazása biztonságos.

#### Vemhesség:

Vemhesség ideje alatt alkalmazható.

#### Laktáció:

Lásd a 10. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k) szakaszt.

### További óvintézkedések

A sertés bőrének kékre színeződött részeit el kell távolítani, mielőtt a többi része emberi fogyasztásra kerül.

**Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók**

A klórtetraciklin spray külsőleges alkalmazását követően a klórtetraciklin felszívódása elhanyagolható mértékű. Más kezeléssel összefüggő gyógyszerkölsönhatásra vonatkozó adatok nem ismertek. Gyógyszerkölsönhatás kialakulása nem várható.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba! Kérdezze meg a kezelő állatorvost vagy gyógyszerészt, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

**14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**

2016. december 23.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

1 spray palack

Kartondoboz 12 x 1 spray palackkal

A készítmény 211 ml térfogatú, műanyag szeleprendszerrel és szórófejjel ellátott, bevonat nélküli túlnyomásos ön szórópalackban kerül kiszerezésre.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.