

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
**Pestorin Mormyx vakcina A.U.V.**

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és gyártó: Bioveta a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Csehország

**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**

Pestorin Mormyx vakcina A.U.V.

Nyulak vérzések elleni és myxomatosis elleni vakcina

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

1 adag (1 ml) tartalma:

Folyékony vakcina: Nyulak vérzések betegségének vírusa (RHDV), inaktivált – min. 128 HAE

Algedratum, Tiomerzál, nátrium-klorid oldat.

Liofilizált vakcina: Myxomatosis vírus, attenuált – min.  $10^{3,3}$  TCID<sub>50</sub>

tápfolyadék liofilizáláshoz, MEM tápfolyadék.

**4. JAVALLAT(OK)**

Egészséges nyulak vérzések betegség és myxomatosis elleni aktív immunizálására.

Az immunitás kialakulása: myxomatosis esetén az oltást követő 9 nap múlva, míg a nyulak vérzések betegség esetén 10 nap múlva alakul ki teljes védelem.

Immunitástartósság: a két oltásból álló alapimmunizálás nyulak vérzések betegség ellen egy évig, myxomatosis ellen 6 hónapig biztosít védelemet.

**5. ELLENJAVALLATOK**

Beteg vagy kachexiás állatok nem vakcinázhatóak. Vemhes nyulak vakcinázása a vemhesség utolsó hetében nem ajánlott a vakcinázással járó stressz miatti vetélés veszélye miatt.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

A vakcinázás helyén pár napon belül mûlõ duzzanat alakulhat ki, ami ismételt oltás esetén kifejezettebb lehet.

Mint minden vakcina, a Pestorin Mormyx vakcina A.U.V. is kiválthat allergiás reakciót, ilyen esetekben tüneti kezelést kell alkalmazni.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, az használati utasításban nem szereplõ hatásokat észlel, értesítse errõl a kezelõ állatorvost!

**7. CÉLÁLLAT FAJOK**

Házinyúl.

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Az adagja 1 ml függetlenül az állat súlyától.

Adagolás: szubkután.

A Pestorin Mormyx vakcina 6 hetes kortól alkalmazható.

Ajánlott vakcinázási program:

Alapimmunizálás:

a) *Alapimmunizálás oltott állatok esetén:*

A 10 hetes kor elõtt monovalens myxomatosis elleni vakcinával oltott állatokat 10 hetes korban kell újraoltani a Pestorin Mormyx vakcinával úgy, hogy a két oltás között legalább két hét különbség legyen.

b) *Alapimmunizálás oltatlan állatok esetén:*

A 6 hetesnél idõsebb Pestorin Mormyx vakcinával oltott állatokat, 4 héttel késõbb kell újravakcinázni.

Emlékeztetõ oltás:

Hathavonta kell végezni, figyelembe véve a myxomatosis szezonális jellegét, hogy a vakcinázás megfelelõ szintû immunitást biztosítson a kritikus idõszakban.

**9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**

Használat elõtt a folyékony vakcina felrázandó. A liofilizátumot a folyékony vakcinában kell feloldani. A feloldott vakcinát 2 órán belül fel kell használni.

**10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDÕ**

Élelmézés-egészségügyi várákozási idõ: A nyulakat nem lehet 7 napig levágni a vakcinázást követõen a lehetséges helyi reakciók miatt.

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELÕÍRÁSOK**

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elõl gondosan el kell zárni!



Száraz helyen és fénytől védve tartandó.  
Hűtőszekrényben tárolandó (2°C - 8°C).  
Fagyástól óvni kell.

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Nem áll rendelkezésre információ a vakcina más állatgyógyászati készítménnyel történő egyidejű alkalmazásának hatékonyságára és ártalmatlanságára vonatkozóan, ezért a vakcina használata előtt vagy után más állatgyógyászati készítmény alkalmazását az eset megítélésétől függően szükséges eldönteni.

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

## 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

## 14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2012. február 28.

## 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az ártalmatlansági vizsgálatok eredménye alapján, a vakcina alkalmazása nem befolyásolja a vemhesség lefolyását.

Hatásmechanizmus: A vakcina antigéntartalma specifikus ellenanyagok termelődését váltja ki, ami az immunizált állat számára a nyulak vérszes betegségével és myxomatosisával szemben védeltséget biztosít.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Vényköteles.

